雪粒子飛び出し風速と雪粒子結晶形

北見工業大学 佐藤研吾 高橋修平

1 はじめに

地吹雪の発生条件を調べるために、ミニ風洞を用いて自然雪面の雪粒子飛び出し風速 V_T を測定した。平行して雪粒子終端落下速度 w 、粒径、安息角、結晶形、気温測定を行い、その関連を調べた。飛び出し風速は新雪時 3~5m/s であったが、1~3 日間で約 10m/s となった。雪粒子の安息角測定による摩擦係数および飛び出し風速、終端落下速度から雪面と雪粒子間の結合力比を見積もり、結晶形別に分類した。

2 雪粒子飛び出し風速・終端落下速度

平らな積雪表面の雪粒子の釣合い(図 1)において、風によって抗力を受けて飛び出そうとする時に、雪粒子が受ける空気抗力 F_v は

$$F_v = C \rho_0 S V_0^2 \quad (1)$$

(C : 抵抗係数 S : 断面積)

雪粒子が雪面から受ける力 F_r は

$$F_r = \mu mg + F_b \quad (2)$$

(μ : 摩擦係数 F_b : 粒子間結合力)

雪粒子が飛び出す瞬間はこれらの力が釣合い、 $F_v = F_r$

$$C \rho_0 S V_0^2 = \mu mg + F_b \quad (3)$$

が成り立つ。

静止空気中での雪粒子の運動について考えると

$$C \rho_0 S w^2 = mg \quad (4)$$

(w : 終端落下速度)

雪粒子が雪面から飛び出す時の風速を V_T とすると、 $C \rho_0 S$ を消去することができ、

$$V_T = K \sqrt{\mu + \frac{F_b}{mg}} w \quad (5)$$

(K : 粒子高さの補正係数)

以上のように理論上では、飛び出し風速 V_T と静止空気中における終端落下速度 w は比例関係となる。

図1 雪粒子にかかる力の概念図

3 観測方法

吹雪発生を想定し、ミニ風洞の中で雪粒子を飛ばす実験を行った。北見工業大学構内グラウンドにおいて、2003年1月1日~2月28日、毎朝7~9時に観測を行った。積雪表面を乱さない状態で表面積雪サンプルを採取して、ミニ風洞下部(図2)に設置し、風洞内の風下から吸引し、風速を徐々に上げていき雪粒子が飛び出した時の風速 V_T を得た。同時に終端落下速度 w の測定を行った。終端落下速度測定装置(図3)は、自然積雪表面より雪粒子を採取し高さ約180cm、直径8cmの筒の中を落下させ、間隔20mmの2つの赤外センサーを通過させる。センサーを通過する時間から速度を求め、信号強度により粒径を求める。雪粒子50~100個の値の平均を測定結果とした。

図2 ミニ風洞

図3 終端落下速度測定装置

4 雪粒子飛び出し風速

図4に雪粒子飛び出し風速 V_T 、実験時気温、日降雪深、毎時間気温を表す。 V_T の*印は表面積雪が乾いた新雪であることを示し、○印はその他の雪粒子形状を示す。2001年1月19、27、30日は1cm以上の降雪があり、 V_T は5m/s前後と小さい値を示したが、それぞれ降雪から1~2日経過すると約10m/sと大きな値となった。降雪後の最高気温はほとんど-5℃以上であり、急に V_T が大きくなったと考えられる。

V_T の増大する原因としては、昇華や表面融解により表面が滑らかな形状に変化して、空気抵抗が小さくなることや、雪面と雪粒子間の結合力が增加することが考えられる。

図4 飛び出し風速 V_T と気象条件

5 雪粒子終端落下速度

図5に2001年1月1日~2月28日の終端落下速度と粒径の観測結果を示す。また図6に粒径と終端落下速度の関係を示す。新雪の場合(*印)の終端落下速度は、粒径によらず0。

5~1.2m/sの小さい値を示したのに対し、新雪ではない雪の場合、終端落下速度は1.2m/s以上の値を示し、粒径が大きいほど終端落下速度は大きくなる傾向を示した。これは降雪後時間を経ると、粒子が丸みを帯びて球の場合の関係式に近づくとして説明される。

図5 結晶系分類による V_T と W の関係

図6 終端落下速度と粒径の関係

6 結晶形による違い

2003年1月1日~2月28日における飛び出し風速 V_T と顕微鏡写真から判断した雪結晶形を示す。ザラメ雪(融解・再凍結の結果、大きい粒径となった雪粒子)は V_T の測定限界である15m/s以上である。

雪粒子結晶形等による違いをさらに明らかにするため、図6に飛び出し風速 V_T と終端落下速度 w の関係を結晶形別に表す。樹枝状結晶の場合は、 $V_T=4\sim 6$ m/s、 $w=0.6\sim 1.0$ m/sであり、広幅六花や雲粒付樹枝は、 $V_T=5\sim 10$ m/s、 $w=1.0\sim 1.5$ m/sの範囲にあった。融解変態粒子の場合、雪粒子結合力 F_b が大きくなったため V_T も大きくなったと考えられる。

図6 結晶系分類による V_T と W の関係

7 安息角による摩擦係数観測

雪粒子間の摩擦力を調べるために安息角の観測を行った。安息角を θ とする時、雪粒子の摩擦係数 μ は

$$\mu = \tan \theta \quad (6)$$

と表される。

安息角の測定は積雪表面の雪粒子を採取し、人工的に雪粒子を落下させて直径 6cm の円板に雪を積もらせ、円錐形の斜面の角度を測定した。図7に安息角実験による摩擦係数 μ と V_T の関係を示す。データ(*印)は $w=0$ 。5m/s 前後の値に相当するが、旧雪はこの関係式から大きくはずれ、大きな V_T を示す。これは融解・再凍結のために、雪粒子結合力 F_b が大きくなり、式(5)において F_b が無視できなくなったためと考えられる。

6 粒子と雪面間の結合力の考察

前述した雪粒子結合力 F_b について考察す

ると、(5)式より F_b/mg は、

$$\frac{F_b}{mg} = \frac{V_T^2}{K^2 W^2} - \mu \quad (7)$$

と表される。 F_b/mg は積雪表面粒子が雪面に対し、どのくらいの強度で付着しているかの指標となる(以後、「結合力比」とする)。安息角 θ から求めた摩擦係数 $\mu (= \tan \theta)$ と、 V_T 、 w の測定値より式(6)を用いて求めた結合力比 F_b/mg を図8に示す。新雪である広幅六花や樹枝状結晶のとき、1~3 と結合力比が小さいのに対し、1月28日以降は融解再凍結を繰り返したため、雪粒子結合力が発生し、結合力比 F_b/mg は 5~10 という大きな値を示したと考えられる(図9)。

図8 結合力比の時系列

図9 結合力比の結晶形別

7 まとめ

- 1) 自然雪面の雪粒子飛び出し風速 V_T は降雪後、日数を経るに従い大きくなった。樹枝状結晶の場合 5m/s 前後だったが、雪粒子の変態に伴い 1~3 日間で 10m/s 以上に大きくなった。

- 2) 枝状結晶の場合、雪粒子飛び出し風速 V_T は 5m/s 前後と小さく、広幅六花や雲粒付樹枝は 5~10m/s の値を示した。融解変態雪粒子は 10m/s の大きい値を示した。
- 3) 安息角は新雪時で 50° 以上、雲付結晶や旧雪では 50° 以下となった。
- 4) 安息角による摩擦係数 μ と飛び出し風速 V_T 及び終端落下速度 w から、粒子結合力 F_b を自重で割った結合力比 F_b/mg が見積もられ、樹枝状結晶ではほぼ 0 と小さく、融解変態粒子については 5~25 の大きい値を示した。