冬季日本海側に発生した帯状降雪雲の特徴

—2013年1月9日の事例—

畠山光¹, 本田明治^{2,3}, 岩本勉之^{2,4}, 浮田甚郎^{2,3}

1: 新潟大院, 2: 新潟大学自然科学系, 3: 新潟大学災害・復興科学研究所, 4: 国立極地研究所

1. はじめに

新潟県柏崎市において、2013年1月8日～17日の10日間、39回のレーウィンゾンデによる高層気象観測（以後、ゾンデ観測）を実施した。観測期間中は冬型の気圧配置の継続と気圧の谷の通過により、柏崎付近では断続的に降水、降雪が続いた。そのうち、今回は、海岸部に帯状の雪雲が停滞し、柏崎市に一晚で30cmの集中降雪をもたらした2013年1月9日の事例について着目する。本研究では、ゾンデ観測および数値実験により得られたデータを用いて、停滞した帯状降雪雲の3次元構造の特徴を明らかにすることを目的とする。

2. 使用データと数値実験設定

ゾンデ観測による高度、気温、湿度、風向、風速を用いた。

また、数値実験にはNCEPおよびNCARが開発した数値モデルWRF (Weather Research & Forecasting Model) 3.5.1版 (Skamarock et al., 2008)を用いた。第1領域を日本海含む日本周辺、第2領域を本州北部、第3領域を新潟周辺と設定し、格子点間隔をそれぞれ9km、3km、1kmとした。計算期間は8日21時～10日9時(JST)で、データの出力間隔はすべて30分ごととした。図2、図3、図4では第3領域の結果を用いている。

3. 気象状況および結果

9日午前中に気圧の谷が通過し、その後冬型の気圧配置となり、午後から10日未明まで上中越の海岸部に帯状の雪雲が停滞した。その間柏崎に約30cmの降雪がもたらされた。9日21時のゾンデプロファイル (図1)によると、地上2500mまでは風速10m/s以下の北東風で、その上空には西風が卓越していた。

全国合成レーダーや地上気象観測による当日の日降水量から、上越と柏崎で強い降水が見られ、数値実験結果でも同じ領域で降水を確認した (図2)。

数値実験では、9日の14時と19時の2回、海岸線に沿う帯状の上昇流帯が到達し、特に19時からは4時間に渡って停滞する様子を再現した (図3)。この上昇流帯は、下層で陸から吹く北東風と季節風が収束し続けることによって長時間停滞していたことが分かった (図4)。このとき、上昇流は700hPa程度 (約2900m)まで達していた。この上昇流により、雪雲が形成され続けていたと推測できる。そして21時のゾンデ観測では、上空2500mまで北東方向に吹く弱風層を観測したことから (図1)、帯状収束雲を停滞させた北東風を捉えられていたと考えられる。Nakai et al., (2005)によると、雪雲は6種類に分類されると示している。そのうちこの帯状収束雲は、海岸付近に停滞するという特徴を持つDモードと呼ばれる雪雲であると考えられる。そのため、今後はDモードに分類されるかどうか検討するため、

似た特徴を持つ他の事例と比較しながら、より詳細に解析を行う必要がある。

参考文献

Skamarock, W. C. et al., 2008: NCAR Tech. Note, NCAR/TN-475+STR, 125pp.
Nakai et al. (2005). A classification of snow clouds by Doppler radar observations at Nagaoka, Japan. SOLA, 1, 161-164

図1. 2013年1月9日21時における風向、風速の鉛直プロファイル。

図2. 2013年1月9日21時における反射強度。

図3. 2013年1月9日21時における925hPa面鉛直風速 (m/s)。

図4. 2013年1月9日21時における975hPa面水平風速 (m/s)。